양로원 노인과 재가 노인의 불안과 우울에 관한 비교조사

영남대학교 의과대학 정신과학교실

서효석 · 정성덕

국군 대구 병원 신경정신과

김 창 수

서 론

경로사상은 우리나라 노인문제의 정신, 사회적 요인중 중요한 변수로 작용할 것이고 일반적으로 노인의 정신질환 가운데 가장 많다고 보고된 우울증과 불안장애에 상당한 영향을 미칠 것이라고 생각된다¹⁻⁵⁾.

그러므로 전통적인 경로사상과 상반되는 핵가족화가 급속히 진행되는 현대사회에 살고 있는 우리나라의 노인들은 소외 격리감을 느껴 심리적 부담이 클 것이고, 특히 가족이나 사회로부터 소외되어 양로원에 수용된 노인의 경우 심리적 압박이 일반 노인보다 클 것으로 예상된다.

한편, 국내에서 노인문제에 대한 연구는 활발하지 못한 실정이나, 노인 인구의 증가와 더불어 정신과를 찾는 노인의 수도 증가하는 추세이므로 노인의 제반문제에 대한 다각적이고도 즉각적인 연구가 절실히 필요한 현실이라 생각된다^{6,7)}.

이러한 관점에서 본 연구는 노인에게 합당한 정신건강 증진대책을 마련하는데 기초자료를 제공할 목적으로 양로원이라는 특수한 지역에 거주하는 노인을 대상으로 재가노인과 비교하여

불안, 우울 양상에서 어떤 차이점이 있는지를 검토하고 여러가지 정신사회의학적 변수들에 따른 노인들의 불안 우울 양상도 검토하고자 하였다. 또한 이들 불안 우울 양상과 신체화 증상간의 상관관계도 조사 하였다.

대상 및 방법

조사대상 중 대구시내에 소재한 4개의 양로원 노인 292명을 대상군으로 하고 양로원이 소재한 지역의 중하류계층 노인 280명을 대조군으로 하여 사전에 훈련된 사회사업과 대학생들에 의해 구조화된 설문지를 통해 조사를 실시하였다. 치매, 청력손상 등으로 인하여 의사소통이 불가능한 경우였던 양로원 노인 84명과, 설문지를 부정확하게 기록하여 자료로서 이용하지 못한 일반가정 노인 69명은 분석 대상에서 제외하였으며, 본 연구는 1991년 1월에서 1991년 5월까지의 기간동안 실시하였다.

검사도구로는 통합불안우울척도(Combined anxiety and depression scale, 이하 CAD로 약함)와^{8,9)} 신체화증상 점검표(Somatization symptom check list, 이하 SCL로 약함)¹⁰⁾를 이용하여 설

울척도¹¹⁾, Beck의 우울척도¹²⁾, Hamilton의 우울척도¹³⁾, Leeds의 불안 우울 자가평가척도¹⁴⁾ 및 Zung의 자가평가 불안척도¹⁵⁾와 DSM-III-R (diagnostic and statistical manual of mental disorder; 3rd ed. revised)¹⁶⁾의 기분장애와 불안장애의 진단기준을 참고로 하여 만들어진 25문항으로 구성된 척도로써 “전혀 그렇지 않다”가 1점, “항상 그렇다”가 4점으로 평가하며 최고 100점부터 25점까지 측정되는 척도이다. 이 척도의 1-16번의 항목은 순수한 우울증상을 나타내며 10-25번 항목은 불안증상을 나타낸다. 10-16번의 항목은 우울과 불안이 중첩된 증상이다.

SCL은 Derogatis¹⁰⁾의 SCL-90중에서 신체화장애에 해당하는 항목을 발췌한 것으로 25문항 4점 척도이며 “전혀 그렇지 않다”가 1점, “항상 그렇다”가 4점이다.

각군의 각 항목별 성적과 총평균점을 평가하고 각군의 연령별, 남녀별 성적도 평가하여 상호 비교하였다. 또 10가지의 사회정신의학적 변수에 따른 각군이 CADS 성적도 각각 비교하였다. 아울러 대상자 중 50점 이상을 비교적 우울이 높은 것으로 간주하여 50점 이상을 얻은 군과 49점 이하의 군에서 각각 SCL점수를 측정하여 CADS와의 상관관계를 비교하였다. 조사 결과는 SPSS로 처리하였고, 양군의 CADS값에 대한 유의성 평가는 χ^2 -검증, 양군의 CADS 총점 비교는 t-검증, 사회정신의학적 요인별 유의성 평가는 ANOVA를 적용하였고 CADS와 SCL의 유의성 평가는 Pearson 상관관계검증을 사용하였다.

성 적

CADS로 평가한 양로원 노인의 총 평균점은 43.40 ± 12.87 이었고 재가 노인은 45.36 ± 10.52

로 나타났으며 양군 간의 유의한 차이는 없었다.

CADS의 각 항목별 분석에서 유의하게 높은 점수를 보인 항목은 양로원에서 절망감, 반복되는 죽으려는 생각, 흥미감소의 항목이었으며, 재가노인은 감정저하, 정신운동지체, 우려, 소화불량, 신체통증, 불안, 공포, 불만족, 현기증, 빈맥의 항목이었다. 양로원 노인과 재가노인에서 공히 높은 점수를 나타낸 항목은 성생활에 무관심과 피로감이었다(표 1).

연령에 따른 CADS 성적은 양로원 노인의 경우 60-69세에서 42.26 ± 12.88 , 70-79세는 43.79 ± 12.61 , 80세이상은 44.25 ± 13.09 이고 재가노인은 60-69세에서 44.79 ± 11.47 , 80세이상은 42.33 ± 9.41 이었고, 성별에 따른 CADS 성적에서 양로원 노인은 남자가 43.29 ± 13.65 , 여자가 43.46 ± 12.46 이고 재가노인은 남자가 41.84 ± 9.89 , 여자가 46.45 ± 10.48 로서 양군의 여자 노인의 비교에서 유의한 차이가 있다($p < 0.05$) (표 2).

CADS 50점 이상과 49점 이하는 양로원 노인의 경우 각각 52명(25.0%), 156명(75.0%)이고 재가노인의 경우 각각 69명(32.7%), 142명(67.3%)이었다(표 3).

사회정신의학적 요인별 CADS 점수 평가중에서 교육정도에서 다른 성적은 양로원 노인의 경우 문맹은 43.14 ± 13.61 , 글을 읽을 수 있는 정도는 42.66 ± 10.75 , 국졸은 41.97 ± 10.61 , 중졸이상은 46.82 ± 14.45 , 재가 노인의 경우 문맹은 45.63 ± 11.82 , 글을 읽을 수 있는 정도는 46.09 ± 9.85 , 국졸은 44.79 ± 10.50 , 중졸이상은 44.69 ± 9.64 이었다(표 4).

종교에 따른 CADS 성적은 양로원 노인의 경우 기독교 신자는 43.16 ± 13.41 , 카톨릭 신자는 45.49 ± 13.26 , 불교 신자는 42.77 ± 10.37 , 종교를 믿지 않는 노인은 40.57 ± 10.20 이었고 재가노인의 경우 기독교 신자는 46.35 ± 11.32 , 카톨릭 신자는 46.17 ± 7.70 , 불교 신자는 $45.67 \pm$

10.63, 유교는 35.00 ± 0.00 , 기타 종교를 믿는 노인은 47.00 ± 10.61 , 종교를 믿지 않는 노인은 44.18 ± 10.82 이었다(표 4).

결혼상태에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 결혼하지 않은 경우는 37.62 ± 10.47 , 결혼한 경우에는 43.80 ± 10.06 , 이혼했거나 별거중인 경우는 45.35 ± 15.98 , 사별한 경우는 43.53 ± 12.50 이었고, 재가노인에서 결혼하지 않은

경우는 52.29 ± 11.02 , 결혼한 경우는 42.49 ± 10.90 , 이혼했거나 별거중인 경우는 47.13 ± 7.69 , 사별한 경우 46.79 ± 9.86 였다(표 4).

건강상태에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 “건강상태가 나쁘다”고 응답한 경우는 48.87 ± 13.53 , “보통이다”는 38.22 ± 8.37 , “좋다”고 응답한 경우는 38.04 ± 10.73 이었고, 재가노인에서 “건강상태가 나쁘다”고 응답한 노인의

Table 1. Comparison between CADS mean score of the elderly in the home for the aged and that of the community elderly

Items	The home for the aged (n=208)	The community (n=208)
	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD
1. Decreased affect	1.71 $\pm$ 0.92	1.88 $\pm$ 0.68*
2. Crying spells	1.75 $\pm$ 0.96	1.66 $\pm$ 0.71
3. Hopelessness	1.70 $\pm$ 0.98**	1.46 $\pm$ 0.77
4. Psychomotor retardation	1.78 $\pm$ 1.02	2.10 $\pm$ 0.78***
5. Suicidal rumination	1.74 $\pm$ 0.97**	1.52 $\pm$ 0.71
6. Apprehension	1.63 $\pm$ 0.85	1.82 $\pm$ 0.74*
7. Loss of interest	1.88 $\pm$ 1.03***	1.46 $\pm$ 0.65
8. Weight loss	1.60 $\pm$ 0.91	1.49 $\pm$ 0.74
9. Indecisiveness	1.92 $\pm$ 1.05	1.92 $\pm$ 0.74
10. Mental disintegration	1.87 $\pm$ 1.03	1.94 $\pm$ 0.77
11. Restlessness	1.54 $\pm$ 0.92	1.46 $\pm$ 0.71
12. Decreased libido	3.75 $\pm$ 0.71	3.79 $\pm$ 0.55
13. Fatigue	2.17 $\pm$ 1.06	2.28 $\pm$ 0.85
14. Indigestion	1.60 $\pm$ 0.96	1.84 $\pm$ 0.82**
15. Sleep disturbance	1.74 $\pm$ 0.98	1.71 $\pm$ 0.80
16. Nightmare	1.60 $\pm$ 0.89	1.70 $\pm$ 0.79
17. Body aches & pains	1.83 $\pm$ 1.03	2.08 $\pm$ 0.87**
18. Anxiousness	1.52 $\pm$ 0.87	1.88 $\pm$ 0.85***
19. Fear	1.23 $\pm$ 0.56	1.41 $\pm$ 0.65***
20. Paresthesias	1.84 $\pm$ 0.95	1.93 $\pm$ 0.81
21. Facial flushing	1.45 $\pm$ 0.84	1.54 $\pm$ 0.73
22. Faintness	1.27 $\pm$ 0.63	1.30 $\pm$ 0.60
23. Dissatisfaction	1.45 $\pm$ 0.80	1.74 $\pm$ 0.72***
24. Dizziness	1.30 $\pm$ 0.63	1.60 $\pm$ 0.68***
25. Palpitation	1.54 $\pm$ 0.84	1.86 $\pm$ 0.86***
Total	43.40 $\pm$ 12.87	45.36 $\pm$ 10.52

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

경우는 50.10 ± 9.29 , “보통이다”는 44.39 ± 10.07 , “좋다”고 응답한 경우는 39.41 ± 10.33 점이었다. 양군 공히 “건강상태가 나쁘다”고 응

답한 노인에서 유의하게 점수가 높았다($p < 0.001$) (표 4).

Table 2. Age and sex distributions with CADS mean score of the elderly in the home for the aged and the community elderly

	The home for the aged (n=208)		The community (n=211)	
	No. (%)	mean $\pm$ SD	N (%)	mean $\pm$ SD
Age				
60 - 69	65 (31.2)	42.26 ± 12.88	118 (55.9)	44.79 ± 9.90
70 - 79	91 (43.7)	43.73 ± 12.61	72 (34.1)	47.17 ± 11.47
Over 80	52 (25.0)	44.25 ± 13.09	21 (10.0)	42.35 ± 9.41
Sex				
Male	73 (35.1)	43.29 ± 13.65	50 (23.7)	41.84 ± 9.89
Female	135 (64.9)	43.46 ± 12.46	161 (76.3)	$46.45 \pm 10.48^*$

* : $p < 0.05$

Table 3. Number(%) of the elderly in the home for the aged and the community by the level of CADS scores

CADS score	The home for the aged (n=208)	The community (n=211)
	No. / %	No. / %
25-49	156 / 75.0	142 / 67.3
50-100	52 / 25.0	69 / 32.7

Table 4. Mean score of the CADS of the elderly in the home for the aged and the community by educational level, religion, marriage, and health status

	The home for the aged (n=208)		The community (n=211)	
	No. (%)	mean $\pm$ SD	No. (%)	mean $\pm$ SD
Educational level				
Illiteracy	94 (45.1)	43.14 ± 13.61	40 (19.0)	45.63 ± 11.82
Can read	62 (28.8)	42.65 ± 10.75	70 (33.2)	46.09 ± 9.85
Elementary school	33 (15.9)	41.97 ± 10.61	56 (26.5)	44.79 ± 10.50
Over middle school	19 (9.1)	46.82 ± 14.45	45 (21.3)	44.69 ± 9.64
Religion				
Protestant	108 (51.9)	43.16 ± 13.41	26 (12.3)	43.35 ± 11.32
Chatholic	57 (27.4)	45.49 ± 13.26	23 (10.9)	46.17 ± 7.70

Table 4. (continued)

	The home for the aged (n=208)		The community (n=211)	
	No. (%)	mean $\pm$ SD	No. (%)	mean $\pm$ SD
Buddhism	13 (6.3)	42.77 $\pm$ 10.37	98 (46.4)	45.67 $\pm$ 10.63
Confucianism	0 (0.0)	0.00 $\pm$ 0.00	1 (0.4)	35.00 $\pm$ 0.00
Others	0 (0.0)	0.00 $\pm$ 0.00	3 (1.4)	47.00 $\pm$ 10.61
None	30 (14.4)	40.57 $\pm$ 10.20	60 (28.4)	44.18 $\pm$ 10.82
Marrital status				
Unmarried	13 (6.3)	37.62 $\pm$ 10.47	7 (3.3)	52.29 $\pm$ 11.02
Married	10 (4.8)	43.80 $\pm$ 10.06	80 (37.9)	42.49 $\pm$ 10.90
Divorced/separated	26 (12.5)	45.35 $\pm$ 15.98	8 (3.8)	47.13 $\pm$ 7.69
Bereaved	159 (76.4)	43.53 $\pm$ 12.50	116 (55.0)	46.79 $\pm$ 9.86
Health status				
Poor	102 (49.0)	48.87 $\pm$ 13.53***	61 (28.9)	50.10 $\pm$ 9.29**
Moderate	54 (26.0)	38.22 $\pm$ 8.37	121 (57.4)	44.39 $\pm$ 10.17
Good	52 (25.0)	38.04 $\pm$ 10.73	29 (13.7)	39.41 $\pm$ 10.33

* : $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$

용돈정도에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 용돈이 없는 경우는 41.99 ± 12.34 , 4,000원미만의 경우는 43.63 ± 13.57 , 4,000-8,000원의 경우는 42.28 ± 13.22 , 8,000-16,000원의 경우는 42.86 ± 9.54 , 16,000-32,000원의 경우는 47.75 ± 14.94 , 32,000-56,000원의 경우는 51.18 ± 14.42 이었고, 56,000원이상인 경우는 54.40 ± 11.37 이었다. 재가 노인에서 용돈이 없는 경우에는 55.40 ± 11.62 , 4,000원 미만은 51.85 ± 10.50 , 4,000-8,000원의 경우는 48.00 ± 9.91 , 8,000-16,000원의 경우는 49.03 ± 12.58 , 16,000-32,000원의 경우는 43.58 ± 7.93 , 32,000-56,000원의 경우는 42.50 ± 9.37 , 56,000원 이상인 경우는 43.19 ± 9.30 이었다(표 5).

용돈에 대한 만족도에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 불만족인 경우는 43.39 ± 12.57 , 보통이라는 경우는 42.77 ± 11.68 , 만족인 경우는 41.73 ± 14.09 , 용돈이 없어서 답변할 수 없다는 경우는 41.82 ± 12.30 점 이었고, 재가 노

인에서 불만족인 경우는 47.30 ± 5.98 , 보통이라는 경우는 46.75 ± 9.98 , 만족인 경우는 42.74 ± 11.24 , 용돈이 없어서 답변할 수 없는 경우는 53.00 ± 13.57 이었다(표 5).

행복감 정도에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 “불행하다”고 응답한 경우는 47.65 ± 13.52 , “보통이다”는 43.30 ± 12.93 , “행복하다”는 38.61 ± 10.04 이었고, 재가 노인에서 “불행하다”고 응답한 경우는 55.82 ± 9.65 , “보통이다”는 44.97 ± 9.69 , “행복하다”는 44.42 ± 12.28 이었다. 양군 공히 “불행하다”라고 응답한 노인에서 유의하게 점수가 높았다($p<0.001$) (표 5).

주위 친숙한 사람에 대한 만족도에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 “불만족이다”라고 응답한 경우는 42.91 ± 13.79 , “보통이다”는 41.44 ± 10.23 , “만족한다”는 45.07 ± 13.78 이었고, 재가 노인에서 “불만족이다”라고 응답한 경우는 50.85 ± 7.48 , “보통이다”는 44.75 ± 10.51 , “만

족한다”는 43.97 ± 11.18 이었다. 재가 노인중 “불만족이다”라고 응답한 경우만 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$) (표 5).

과거직업에 대한 만족도에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 “불만족이다”라고 응답한 경우는 49.50 ± 15.44 , “보통이다”는 42.93 ± 9.68 ,

Table 5. Mean score of the CADS of the elderly in the home and the community by pocket money, satisfaction with the pocket money, happiness, satisfaction with the familiar people, satisfaction with the past occupation and future view

	The home for the aged (n=208)		The community (n=211)	
	No. (%)	mean $\pm$ SD	No. (%)	mean $\pm$ SD
Pocket Money				
None	89 (42.8)	41.99 ± 12.34	5 (4.0)	55.40 ± 11.62
less than W 4,000	38 (18.3)	43.63 ± 13.57	13 (6.2)	51.85 ± 10.55
W4,000-8,000	29 (13.9)	42.28 ± 13.32	19 (9.0)	48.00 ± 9.91
W8,000-16,000	29 (13.9)	42.86 ± 9.54	36 (17.1)	49.03 ± 12.58
W16,000-32,000	8 (3.9)	47.75 ± 14.94	31 (14.7)	43.58 ± 7.93
W32,000-56,000	11 (5.3)	51.18 ± 14.42	44 (20.8)	42.50 ± 9.37
Over W 56,000	4 (1.9)	54.50 ± 11.37	63 (29.8)	43.19 ± 9.30
Satisfaction with the Pocket Money				
Satisfied	37 (17.8)	41.73 ± 14.09	84 (39.8)	42.74 ± 11.24
Moderate	13 (6.2)	42.77 ± 11.68	102 (48.3)	46.75 ± 9.89
Unsatisfied	70 (33.7)	46.39 ± 12.57	20 (9.5)	47.30 ± 5.98
No response	88 (42.3)	41.82 ± 12.30	5 (2.4)	53.00 ± 13.57
Happiness				
Unhappy	63 (30.3)	$47.65 \pm 13.52^{***}$	11 (5.2)	$55.82 \pm 9.65^{***}$
Moderate	89 (42.8)	43.40 ± 12.93	131 (62.1)	44.97 ± 9.69
Happy	56 (26.9)	38.61 ± 10.04	69 (32.7)	44.42 ± 11.28
Familiar people				
Satisfied	91 (43.5)	45.07 ± 13.78	39 (18.5)	43.97 ± 11.18
Moderate	63 (30.1)	41.44 ± 10.23	146 (69.2)	44.75 ± 10.51
Unsatisfied	53 (25.4)	42.91 ± 13.79	26 (12.3)	$50.85 \pm 7.48^*$
Satisfaction with the past occupation				
Satisfied	77 (37.0)	44.03 ± 13.39	36 (17.0)	42.33 ± 12.24
Moderate	28 (13.5)	42.93 ± 9.68	59 (28.3)	43.88 ± 8.30
Unsatisfied	24 (11.5)	$49.50 \pm 15.44^*$	17 (8.1)	$51.35 \pm 8.99^*$
No occupation	79 (38.0)	41.10 ± 11.77	99 (46.9)	43.30 ± 10.72
Pessimistic	52 (24.9)	$47.75 \pm 13.36^*$	22 (10.4)	$54.77 \pm 9.52^{***}$
Moderate	120 (57.4)	41.97 ± 12.27	132 (62.6)	44.13 ± 9.27
Optimistic	35 (16.7)	42.00 ± 12.85	57 (27.0)	44.56 ± 11.73

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

“만족이다”는 44.03 ± 13.39 , “직업이 없었다”는 경우는 41.10 ± 11.77 이었고, 재가 노인에서 “불만족이다”라고 응답한 경우는 51.35 ± 8.99 , “보통이다”는 43.88 ± 8.30 , “만족이다”는 42.33 ± 12.24 , “직업이 없었다”는 46.30 ± 10.72 이었다. 양군 공히 “불만족이다”라고 응답한 경우에서 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$) (표 5).

미래에 대한 전망에 따른 CADS 성적은 양로원 노인에서 “비관적이다”라고 응답한 경우는 47.75 ± 13.36 , “보통이다”는 41.97 ± 12.27 , “낙관적이다”는 42.00 ± 12.85 이었고, 재가 노인에서 “비관적이다”라고 응답한 경우는 54.77 ± 9.52 , “보통이다”는 44.13 ± 9.27 , “낙관적이다”는 44.56 ± 11.73 이었다. 양군 공히 “비관적이다”라고

응답한 경우에는 유의한 차이가 있었으나 재가 노인의 경우 더 유의한 차이를 나타내었다(대상군 : $p < 0.05$, 대조군 : $p < 0.001$) (표 5).

양로원 노인에서 CADS 점수 49점 이하의 경우 SCL의 평균점수는 33.76 ± 14.77 이었고, CADS 점수 50점 이상의 경우 SCL의 평균점수는 45.82 ± 20.71 이었다. 재가 노인에서 CADS 점수 49점 이하의 경우 SCL의 평균점수는 34.65 ± 13.75 , CADS 점수 50점 이상의 경우 SCL의 평균 점수는 44.17 ± 17.72 이었다. 양군 공히 매우 유의한 차이가 있었다($p < 0.001$). 또한 각 항목 모두에서도 매우 유의한 차이가 있었다($p < 0.001$) (표 6, 7).

Table 6. SCL scores of the elderly in the home for the aged divided by CADS scores under 49 and over 50

Items	Under 49 (n=156)	Over 50 (n=52)
	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD
1. Weight Change	1.41 $\pm$ 0.55	2.12 $\pm$ 0.89***
2. Chronic fatigue	1.54 $\pm$ 0.78	2.87 $\pm$ 1.00***
3. Insomnia or hypersomnia	1.61 $\pm$ 0.73	2.35 $\pm$ 1.17***
4. Intolerance	1.14 $\pm$ 0.43	1.40 $\pm$ 0.69***
5. Bloating	1.32 $\pm$ 0.52	1.44 $\pm$ 0.69***
6. Abdominal pain	1.21 $\pm$ 0.40	1.48 $\pm$ 0.72***
7. Diarrhea	1.08 $\pm$ 0.32	1.39 $\pm$ 0.80***
8. Pain in extremities	1.92 $\pm$ 0.92	2.75 $\pm$ 1.11***
9. Urinary retension or painful urination	1.14 $\pm$ 0.40	1.35 $\pm$ 0.68***
10. Shortness of breath	1.47 $\pm$ 0.76	2.31 $\pm$ 1.07***
11. Chest pain	1.31 $\pm$ 0.58	1.87 $\pm$ 0.88***
12. Aphasia or deafness	1.45 $\pm$ 0.69	1.88 $\pm$ 0.93***
13. Blurred or double vision	1.59 $\pm$ 0.78	2.04 $\pm$ 1.04***
14. Fainting spells	1.05 $\pm$ 0.22	1.21 $\pm$ 0.41***
15. Muscle weakness	1.63 $\pm$ 0.93	2.31 $\pm$ 0.35***
16. Choke sensation	1.28 $\pm$ 0.54	1.92 $\pm$ 0.90***
17. Dizziness	1.47 $\pm$ 0.66	1.92 $\pm$ 0.80***
18. Palpitation	1.33 $\pm$ 0.57	1.73 $\pm$ 0.79***
19. Trembling or twitching	1.13 $\pm$ 0.42	1.46 $\pm$ 0.60***
20. Dry mouth or cold sweating	1.42 $\pm$ 0.68	1.96 $\pm$ 0.94***

Table 6. (continued)

Items	Under 49 (n=156) mean $\pm$ SD	Over 50 (n=52) mean $\pm$ SD
21. Muscle tension	1.35 $\pm$ 0.62	1.87 $\pm$ 0.92***
22. Nausea	1.22 $\pm$ 0.53	1.52 $\pm$ 0.82***
23. Flushes	1.31 $\pm$ 0.64	1.71 $\pm$ 0.82***
24. Chilling sensation	1.23 $\pm$ 0.62	1.63 $\pm$ 0.99***
25. Trouble swallowing	1.15 $\pm$ 0.48	1.33 $\pm$ 0.70***
Total	33.76 $\pm$ 14.77	45.82 $\pm$ 20.71***

***p<0.001

Table 7. SCL scores of the elderly in the community divided by CADS scores under 49 and over 50

Items	Under 49 (n=142) M $\pm$ SD	Over 50 (n=69) M $\pm$ SD
1. Weight Change	1.58 $\pm$ 0.57	1.97 $\pm$ 0.54***
2. Chronic fatigue	1.84 $\pm$ 0.51	2.23 $\pm$ 0.66***
3. Insomnia or hypersomnia	1.61 $\pm$ 0.58	2.17 $\pm$ 0.92***
4. Intolerance	1.24 $\pm$ 0.53	1.57 $\pm$ 0.65***
5. Bloating	1.33 $\pm$ 0.59	1.62 $\pm$ 0.72***
6. Abdominal pain	1.32 $\pm$ 0.62	1.51 $\pm$ 0.92***
7. Diarrhea	1.04 $\pm$ 0.23	1.45 $\pm$ 0.68***
8. Pain in extremities	1.90 $\pm$ 0.63	2.45 $\pm$ 0.94***
9. Urinary retention or painful urination	1.32 $\pm$ 0.61	1.55 $\pm$ 0.73***
10. Shortness of breath	1.45 $\pm$ 0.60	1.91 $\pm$ 0.70***
11. Chest pain	1.45 $\pm$ 0.66	1.81 $\pm$ 0.71***
12. Aphasia or deafness	1.44 $\pm$ 0.54	1.58 $\pm$ 0.67***
13. Blurred or double vision	1.43 $\pm$ 0.54	1.75 $\pm$ 0.65***
14. Fainting spells	1.11 $\pm$ 0.44	1.25 $\pm$ 0.49***
15. Muscle weakness	1.22 $\pm$ 0.45	1.72 $\pm$ 0.80***
16. Choke sensation	1.29 $\pm$ 0.45	1.74 $\pm$ 0.69***
17. Dizziness	1.30 $\pm$ 0.49	1.68 $\pm$ 0.58***
18. Palpitation	1.45 $\pm$ 0.63	1.90 $\pm$ 0.59***
19. Trembling or twitching	1.23 $\pm$ 0.50	1.54 $\pm$ 0.58***
20. Dry mouth or cold sweating	1.44 $\pm$ 0.55	1.94 $\pm$ 0.63***
21. Muscle tension	1.51 $\pm$ 0.59	1.93 $\pm$ 0.71***
22. Nausea	1.32 $\pm$ 0.56	1.55 $\pm$ 0.63***
23. Flushes	1.26 $\pm$ 0.48	1.78 $\pm$ 0.83***
24. Chilling sensation	1.42 $\pm$ 0.97	2.06 $\pm$ 1.07***
25. Trouble swallowing	1.15 $\pm$ 0.43	1.51 $\pm$ 0.63***
Total	34.65 $\pm$ 13.75	44.17 $\pm$ 17.72***

*** : p<0.001

고 찰

선행연구^{8,9)}에서 Zung 불안척도¹⁵⁾와 CADS의 상관관계는 $r=0.64$ 였으며, Zung 우울척도¹¹⁾와는 $r=0.61$, Leeds 불안우울척도¹⁴⁾와는 $r=0.77$ 로 상당한 관계가 있는 것으로 평가되었다.

양로원 노인과 재가 노인들의 우울과 불안증상의 비교에서 각군 여자의 경우에는 재가 노인의 CADS 점수가 유의하게 높았지만 양군의 총평균에서 유의한 차이는 없었다. 박 등¹⁷⁾은 양로원 노인과 재가 노인간에 우울정도에 차이가 없다 하였는데 비록 우울을 불안과 분리하여 측정하였지만 본 연구의 결과와 일치하는 바가 있다고 생각된다. 그러나 이 결과는 양로원 노인이 재가 노인보다 불안 우울 등의 비교에서 심인성 증상이 많을 것이라는 가설과는 달랐다. 또 여자 노인의 비교에서 CADS점수가 남자의 경우와 달리 유의하게 차이가 나는 것은 같은 상황에서 여성이 더 민감하게 불안 우울증상을 보이기 때문이라고 생각되고, 여성이 남성보다 불안 우울증상이 더 많다는 선행연구¹⁸⁻²²⁾와도 일치하는 것으로 생각된다.

CADS에 따른 양군 특성의 비교에서 양로원 노인들이 주요 우울항목이 측정되고 재가 노인들이 불안 항목에서 높게 측정된 것은 의미있는 결과로서, 류 등²³⁾도 재가 노인의 불안 증상에 대해 보고하였다. Johnstone 등²⁴⁾은 불안장애와 우울증은 단일장애의 변형이라 하였고, Belodi 등²⁵⁾은 우울과 불안이 기저의 유발인자에 따라 어느 쪽 증상으로도 나타날 수 있다고 하였던바 본연구에서 재가 노인이 불안증상이 많은 것은 그들만이 가지는 환경적 변수가 불안 증상이 더 많이 나타나게 한 유발인자로 작용했을 것이라 생각된다. 또한 김 등²⁶⁾은 노인에서의 불안은 상실과 이별에 대한 공포로 부터 유래된다고 하였고, 불안은 죽음에 대한 공포로 표현되는 수도 많지만 경제적 손실, 주위사람에 대한

거절과 신체질환에 대한 불안으로 변형된다 하였다. 이에 따르면 재가 노인에서 불안 증상이 많은 것은 이미 사별등 상실과 이별을 더 겪었을 것으로 보이는 양로원 노인보다 그렇지 않은 재가노인이 상실과 이별에 대한 공포, 즉 불안이 더 많기 때문이라 생각한다.

선행연구^{8,9)}에서 CADS 50점 이상을 비교적 우울이 높은 것으로 간주하였으며 이 기준에 따라 50점이상의 CADS총점을 얻은 조사 대상자의 수는 양로원 노인에서 52명 노인에서 52명(25%), 재가 노인에서 69명(32.7%)이었다. 정 등²⁷⁾은 5,869명의 대학생을 대상으로한 연구에서 전체의 23.0%인 1,366명이 Zung 우울척도에서 50점 이상을 기록하였으며, 박 등²⁸⁾은 296명의 양로원 노인들에 대한 연구에서 29.0%인 56명이 Zung 우울 척도에서 50점 이상이었다고 보고하였는데 본 연구의 결과도 이들과 거의 비슷한 수준이었다.

두번째로 우울과 관련된 몇 가지 사회정신의학적 요인의 조사에서 교육수준, 종교및, 결혼 상태에 따른 CADS 점수는 유의한 차이가 없었고 교육정도와 종교에 따른 우울의 정도에 차이가 없다는 이전 연구와도 일치하였다¹⁷⁾.

건강상태가 나쁘다고 생각하는 노인의 CADS 점수가 유의하게 높았는데 이는 신체화 증상이 우울 불안과 연관함을 추정할 수 있고 또한 양군 모두에서 불행하다고 답한 대상자들이 높은 점수를 보였는데($p<0.001$) 이는 “우울증은 사랑의 대상에 대한 원망을 자신의 자아로 돌리는 것 뿐이다”는 우울의 정신역동적인 면으로 볼 때 노인은 그 불행의 원인은 자신의 탓으로 보는 내향화(introjection)의 경향이 높다고 해석할 수 있다^{29,30)}.

용돈정도에 따른 차이는 양로원 노인에서 용돈이 많을 수록 점수가 높고, 재가 노인에서는 용돈이 작을 수록 점수가 높는데 이는 양군 모두 용돈이 적을 수록 우울증상이 많다는 선행 연구

19)와는 상반된 결과로서 앞으로 더 추가적인 변수의 조사가 필요하다고 보여 진다. 또 용돈에 대한 만족도에 따른 CADS 점수는 양군 공히 만족도가 높을 수록 수치가 낮았으나, 용돈이 없을 경우에는 재가 노인에서 높았고 이는 기대치가 높을 경우, 즉 가족과 같이 살고있는 재가 노인들은 대개 용돈이 양로원 노인보다 많았고 상대적으로 용돈이 없는 경우는 더 부족함을 느낄 수 있을 것으로 보이나 대상수가 적고 커서 일관성은 없다고 생각된다.

불행하다고 답변한 양군의 노인에서 CADS 점수가 매우 유의하게 높았는데 이는 쉽게 예상되는 항목이었으나 통계적으로 확인이 되었다.

재가 노인에서 “주위 친숙한 사람에 대한 불만족이다”라고 응답한 노인에서 CADS 점수가 높았는데 이 경우는 노인에 있어 주위 친숙한 사람이란 가족일 것임으로 이에 대한 불만이 더 크게 심리적으로 압박으로 작용하여 불안우울 증상으로 나타났다고 보여진다.

미래에 대해 비판적으로 생각한 대상자들이 점수가 높았으며 그 중 재가 노인에서 유의하게 더 높았고($p<0.001$), 이는 재가 노인에서 비판적으로 응답한 대상자의 수가 양로원 노인보다 의미있게 적었다는 것 외는 분명한 차이점을 발견할 수 없었다.

Fawcett와 Kravitz³¹⁾는 우울증에서 동반되는 증상들에 대해 관찰하였는데 우울환자들에서는 불안과 신체화 증상이 함께 동반된다고 보고하였다. 본 연구에서도 CADS 50점 이상인 대상자들은 우울이 심한 대상자의 경우 모두 어느 정도의 신체화 증상을 가진다는 사실을 간접적으로 설명한 것으로 사료되며 이는 불안 우울 증상에는 신체화증상이 동반되는 경우가 많다는 선행연구의 결과와도 일치 하였다^{19, 32, 33)}.

본 연구의 문제점으로는 재가 노인들이 양로원 노인들보다 비교적 나이가 적으므로 해서

결과에 영향을 미칠수도 있다는 점이 고려되지 않고 대상으로 선정된 점, 양군 모두 일정지역에 제한된 표본이라는 점을 들 수 있겠다.

요 약

1991년 1월 부터 1991년 5월까지 양로원 및 재가 노인을 대상으로 통합 불안우울척도(CADS)와 신체화증상척도(SCL)를 이용하여 불안과 우울 및 신체화증상을 조사한 결과는 다음과 같다.

각군의 CADS 평균총점간 통계적으로 유의한 차이는 없었다. 그러나 각군의 여자대상자의 비교에서는 양로원 노인군에서 유의하게 높았다($p<0.05$).

양로원 노인군은 절망감, 반복되는 죽으려는 생각, 흥미감소의 항목, 즉 주요우울증상에서 유의하게 높은 점수를 보였고 재가 노인군은 감정저하, 정신운동 지체, 우려, 소화불량, 신체통증, 불안, 공포, 불만족, 현기증, 빈맥의 항목, 즉 불안증상에서 높은 점수를 보였다.

비교적 높은 불안 우울증상을 가졌음을 지적하는 50점 이상의 CADS 점수를 보인 대상은 재가 노인에서 “주위 사람과의 관계에서 불만족이다”(p<0.05)라고 답한 노인들과 양집단 모두에서 “불행하다”(p<0.001), “건강이 나쁘다”(p<0.001), “과거직업에 불만족이다”(p<0.05), “장래에 대해 비판적이다”(대상군 : p<0.05, 대조군 : p<0.001)라고 응답한 노인들이었다.

양집단에서 CADS 총점이 49점 이하인 노인들과 50점 이상인 노인들은 모두 SCL의 모든 항목에서 유의한 차이를 보여(p<0.001) 노인들의 신체화 증상은 그들의 불안우울증세와 상관이 있는 것으로 나타난다.

참고문헌

1. 김규삼: 노인 문제의 대두와 노인의 노령화. 노인복지론. 학문사. 서울, 1985, pp 19-48.
2. 변원탄: 노인 정신장애자에 대한 임상적 고찰. 신경정신의학 16(3): 302-311, 1977.
3. 윤석하: 최근 10년간 종합병원 정신과에 내원한 노인환자에 대한 개관. 경북의대잡지 15(1): 75-88, 1974.
4. 이은주, 박종환: 노인 정신질환자의 통계적 고찰. 신경정신의학 21(3): 343-352, 1982.
5. 민병근, 이길홍: 노인 정신병. 한국의과학, 14(2)15-19, 1982.
6. 김성순: 노인 복지의 개념과 발전과정. 노인복지론. 재판, 이우출판사, 서울, 1985, pp 61-78.
7. 김광일, 원호택: 신경정신과 입원환자에 대한 통계적 고찰. 최신의학 17(1): 83-96, 1974.
8. 이종범, 김창수, 박형배, 박병탁, 이종훈, 정성덕: 신우울불안척도에 의한 대학 신입생의 정신건강 평가. 영남의대학술지 4(2): 29-88, 1987.
9. 김창수, 정성덕: 불안, 우울 통합척도의 임상적 적용. 신경정신의학 28(6): 1000-1007, 1989.
10. Derogatis LR, Lipman RS, Covi L: SCL-90. An outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. Psychopharmacol. Bull, 13, 27, 1973.
11. Zung WWK: A self-rating depression scale. Arch gen psychiatry 12: 63-70, 1965.
12. Beck AT, et al: Inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 4: 561-571, 1961.
13. Hamilton M: Development of a rating for primary depressive illness. British Journal of Social and Clinical Psychology 6: 278-296, 1967.
14. Snaith RP, Bridge GWK, Hamilton M: The Leeds scales for the Self Assessment of Anxiety and Depression Brit. J. Psychiatry 128: 156-165, 1976.
15. Zung WWK: A self-rating depression scale. Arch gen psychiatry 12: 63-70, 1971.
16. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders. Third ED, Revised(DSM-III-R), American Psychiatric Association, Washington D.C., 1989.
17. 박병탁, 이종범, 이종훈, 정성덕: 양로원 재원노인의 우울에 관한 연구. 영남의대학술지 7(2): 79-87, 1990.
18. 민성길, 김경희: 우울증에서 보는 신체증상에 관한 연구. 신경정신의학 17(2): 149-154, 1990.
19. 이철규: 최근 8년간 정신신경과 입원 및 외래환자에 대한 통계적 고찰. 신경정신의학 8(1)9-19, 1969.
20. 홍완호: 우울증 빈도의 남녀대비에 관한 고찰. 신경정신의학 17(4)411-422, 1978.
21. Weissman MM, Klerman: Sex difference and the epidemiology of depression. Arch Gen Psychiatry 34: 98-111, 1979.
22. Weissman MM, Leaf PJ, Bruce ML, Florio L: The epidemiology of dysthymia in five communities. Am J Psychiatry 145(7): 815-819, 1988.
23. 류성훈, 이귀행, 오상우: 노인의 우울.

- 불안 및 인지기능에 미치는 인자들의 영향에 관한 연구. 신경정신의학 29(4):832-841, 1990.
24. Jonstone EC, et al : Neurotic illness & its response to anxiolytic & antidepressant treatment. Psychol Med 10 : 321-328, 1980.
25. L. Bellodi, O. Gambini, Brancato : Anxious depression ; assessment and treatment, symptoms and syndromes of anxious depressive patients . Raven Press, New York, 1987, pp 33-41, 1987.
26. 김이영 : 노인의 심리. 정신의학보 6(6) : 127-129. 1982.
27. 정성덕 : 우울척도에 의한 대학생의 정신건강에 대한 평가. 영남의대학술지 2(1) : 113-122, 1985.
28. 박병탁, 김진성, 박형배, 권복순, 이중훈, 이종범, 정성덕 : 양로원 재원노인의 정신건강에 관한 연구. 영남의대학술지 3(1) : 121-130. 1986.
29. 손진욱 : 우울증의 정신역동에 관한 임상적 연구. 서울의대정신의학 13(3) : 77-85, 1988.
30. Freud S. : Mourning and Melancholia. The Complite Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. XIV, The Hogarth Press, London, 1917, pp 3-20.
31. Fawcett J, Kravitz HM : Anxiety syndromes and their relationship to depressive illness. J Clin Psychiatry 44 : 8-11, 1983.
32. Simon GE, Vonkorff M : Somatization and Psychiatric Disorder in the NIMH Epidemiologic Catchment Area Study . Am J Psychiatry 148(11) : 1494-1500, 1991.
33. Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC : Textbook of Psychiatry. Washington DC, Am Psy Press, 1988, pp 1128-1133.

-Abstract-

Comparison of the Depression and Anxiety between the Elderly in the Home for the Aged and Those in the Community

Hyo Seok Seo, Sung Duk Jung

Department of Psychiatry

College of Medicine, Yeungnam University

Taegu, Korea

Chang Su Kim

Department of Neuropsychiatry

Taegu Military Hospital

This survey was conducted from January 1991 to May 1991. Two hundred and eight residents in 4 government supported homes for the aged and two hundred and eleven living in the community in Taegu, Korea, were examined to evaluate the depression and the anxiety of the aged with combined anxiety and depression scale(CADS) and somatization symptom check list(SCL).

There are no significant differences between residents in the home for the aged and those living in the community on the total scores of CADS and SCL. However, in the case of total score of CADS of the female subjects in the home for the aged were significantly higher than those of the community residents.

The elderly in the home for the aged tended to have pure depression, while community residents were likely to have anxiety and depression.

Fifty-two subjects of home for the aged and sixty-nine of the community scored over 50 points of CADS, which indicates considerable depression or anxiety.

In psychosocial factors, the subjects who in the following situations had statistically significant higher scores than others. The results were as follow. Poor health, unhappiness, unsatisfaction to the past occupation, pessimistic thought in future view for both group and unsatisfaction of the relationship with familiar people for the elderly in the community.

The SCL scores of two groups subgrouped by under 49 and 50 on CADS showed significant difference between each subgroup on all of the SCL items. It could be suggested that somatic symptoms for the aged is a sign of depression.

Key Words : Anxiety, CADS, Depression, Home for the aged