비인강암의 방사선치료성적

영남대학교 의과대학 치료방사선과학교실

신세원 · 김성규 · 김명세

서 론

비인강은 해부학적으로 두개골 기저부에 인접하여 위치하기 때문에 초기 비인강암에서는 특별한 증상없이 지내다가 국소적으로 진행이 되면 비폐색을 일으키거나, 이관 폐쇄로 인한 청각 이상을 초래한 경우에 우연히 발견된다. 또한 경부 임파선 전이를 일으킨 경우에 경부 결절의 진단 과정에서 비인강에 원발 병소를 발견하기도 하며, 비특이적인 두통을 호소하거나 뇌신경 마비로 인한 신경학적인 검사 과정에서 비인강의 원발 병소를 발견하기도 한다. 심지어 경부 임파선 종대의 해부학적 위치나 병리조직 검사상 미분화 세포암으로 확인이 되면 원발 병소가 비인강일 가능성이 많으므로 육안적으로 정상인 경우에도 맹목으로 비인강의 조직검사(blind biopsy)를 시행하여 발견되기도 한다.

이러한 비인강암은 해부학적인 위치상 근치적인 수술이 불가능하므로 방사선 치료가 일차적인 치료법으로 공인되고 있으며 지난 수십년간 진단 방법의 발달과 치료방법의 개선이 꾸준히 있어 왔으나 원발병소 및 경부 임파선 전이 병변의 제어율이나 생존율의 향상은 기대에 부응하지 못하고 있는 실정이다.

본 연구는 이러한 문제점을 다소나마 해결하고자 하는 바램에서 다양한 치료방법을 이용한

비인강암의 치료에서 국소 종양 및 경부 임파선 전이의 치유정도와 치료후 생존 상태를 치료 방법 및 이미 알려진 예후결정 인자와의 상호 연관성을 분석 검토함으로써 향후 비인강암 치료의 기본 방침 결정에 참고로 하기 위하여 후향적으로 본 연구를 시행하였으며 얻어진 결과를 문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다.

재료 및 방법

1986년 4월부터 1992년 3월까지 6년간 영남대학교 의과대학 부속병원에서 병리조직학적으로 확진되어 근치적인 방사선치료를 시행한 후 최소한 6개월이상 추적조사가 가능하였던 31명의 환자를 대상으로 하였다.

방사선치료는 크게 두개의 군 즉 외부 방사선 치료만 시행한 방사선 단독치료군과 방사선치료 이외의 다른 치료 방법인 유도 화학요법, 외과적 절제술 및 경관조사를 병합한 병합 치료군으로 나누었으며, 후자는 다시 유도 화학요법과 외부 방사선 치료군, 유도 화학요법후 외부 방사선 치료와 경관조사를 시행한 군, 유도 화학요법과 골 정이를 일으킨 늑골절제술후 외부 방사선 치료와 경관조사를 시행한 4개의 군으로 다시 나누었다. mg $\times$ 5회와 cis-platinum 80 mg을

2회 3주일 간격으로 주사하였으며, 대개 유도 화학요법 시행후 2-3주일 경과후 외부 방사선 치료를 시작하였다. 외부 방사선치료는 본원 치료방사선과에 설치 가동중인 코발트 원격 치료기를 이용하여 매주5회씩 5주일간 비인강 원발 병소와 경부임파선 부위를 치료한 다음, 코발트 원격 치료기나 10MV-X선을 이용하여 축소 조사를 통한 원발 병소에 대한 치료를 시행하였으며, 경부 임파선 부위는 진단 당시의 크기에 따라 축소 조사를 통하여 추가 선량을 조사하였으며 때로는 전자식 치료도 병행하였다. 만약 원래 계획한 선량을 조사한 후에도 원발 병소의 병변이 육안적으로 잔류 상태이거나 외부방사선 치료만으로 불충분한 선량의 조사가 곤란한 경우에는 경관조사를 이용하여 추가선량을 조사하였다.

일반적으로 비인강의 원발 병소에는 임상적 병기에 따라 6,000에서 6,500 cGY를 조사하였으며 경부 임파선 부위에는 크기에 따라 6,000에서 7,000cGY까지 조사하였다.

모든 환자는 방사선 치료 시작일로 부터 치료 성과 판정을 위한 추적 조사에 참여시켰으며, 치료에 대한 반응 정도는 치료 완료후 이학적 소견과 각종 영상 진단법을 이용하여 완전 관해(complete response), 부분 관해(partial response), 및 무반응(noreponse)군으로 나누었다.

치료 방법에 따라 1년에서 5년까지 생존율을 산출하였으며 완전 관해된 환자의 추적 과정에서 치료방법, 조직학적 분류에 따른 재발의 양상도 분석 검토하였다.

성 적

본 연구의 대상 환자의 성별에 따른 분포는 남성이 22명으로 여성보다 2.4배 많았으며, 연령 분포는 최연소자가 20세에서 최고령자가 64세

까지 있었으며(중앙값 : 49세), 50대가 9명, 30대가 7명, 40대와 60대가 각각 6명, 20대가 3명의 순으로 30대이후는 고른 분포를 보였다.

병리 조직학적 분류상 편평 세포암이 13명, 미분화 세포암이 18명이었으며, 임상적 병기는 I 기가 1명, II 기가 2명, III 기가 6명, IV기가 22명이었다(표 1).

Table 1. Patients characteristics

A. Age group(range : 20-64 , median : 49)	
below 4th decade	3(2)
4th decade	7(2)
5th decade	6(1)
6th decade	9(2)
over 6th decade	6(2)
B. Histology	
squamous cell carcinoma	13(3)
undifferentiated carcinoma	18(6)
C. Clinical stage	
stage I	1
stage II	2(1)
stage III	6(2)
stage IV	22(6)
Total	31(9)

() : female patients

치료법은 방사선 단독치료군이 11명, 유도 화학요법에 이은 방사선치료군이 16명, 유도 화학요법에 이어 방사선치료와 강내치료를 시행한 경우가 1명, 유도 화학요법 및 늑골 전이 절제술후 방사선치료와 경관조사를 시행한 경우가 1명이었다(표 2.3).

병리 조직학적 분류에 따른 치료방법은 편평 세포암에서는 방사선 치료만 시행한 환자가 6명, 병합요법을 시행한 환자가 5명이었으며, 미분화 세포암에서는 방사선치료만 시행한 경우가 5명, 병합요법을 시행한 경우가 14명이었다(표 4).

Table 2. Clinical stage and treatment modalities

Modalities	Clinical stage	I	II	III	IV	Total
External radiotherapy alone		1	—	1	9	11
Combined modalities		—	2	5	13	20
Total		1	2	6	22	31

Table 3. Types of combined modalities treatment

Combination	Clinical stage	I	II	III	IV	Total
Induction chemotherapy + external radiotherapy		—	1	5	10	16
Induction chemotherapy + external radiotherapy + transcatheter radiation		—	1	—	1	2
Induction chemotherapy + functional neck dissection + external radiotherapy		—	—	—	1	1
Induction chemotherapy + rib resection + external radiotherapy + transcatheter radiation		—	—	—	1	1
Total		—	2	5	13	20

Table 4. Cell type and treatment modalities

Modalities	Cell type	squamous cell carcinoma	undifferentiated carcinoma	Total
External radiotherapy alone		6	5	11
Combined modalities				
Induction chemotherapy +				

Table 4. (continued)

Modalities	Cell type	squamous cell carcinoma	undifferentiated carcinoma	Total
external radiotherapy		5	11	16
Induction chemotherapy + external radiotherapy + transcatheter radiation		2	—	2
Induction chemotherapy + functional neck dissection + external radiotherapy		—	1	1
Induction chemotherapy + rib resection + external radiotherapy + transcatheter radiation		—	1	1
Total		13	18	31

Table 5. Treatment response

Response	Types of treatment	external radiotherapy	combined modalities	Total
Complete response		8(3/5)	14(6/8)	22(9/13)
Partial response		1(1/0)	2(1/1)	3(2/1)
No response/progression		2(2/0)	4(1/3)	6(3/3)
Total		11(6/5)	20(8/12)	31(14/17)

(No. of squamous cell carcinoma/No. of undifferentiated carcinom)

Table 6. Survival rate(%) by treatment modality

Type of treatment	1-year	2-year	3-year	4-year	5-year
External radiation alone	63.6	54.5	36.3	27.2	9.0
Combined modalities	65.0	25.0	15.0	15.0	15.0
Average survival rate	64.5	35.4	22.6	19.4	12.4

방사선치료만 시행한 경우에 완전 관해가 8명, 병합요법을 시행한 경우는 14명이었고, 부분 관해를 보인 경우는 각각 1명과 2명으로 71.0

%의 완전 관해율과 9.7%의 부분 관해를 보여 치료 방법에 따른 차이를 발견할 수 없었다(표 5).

Table 7. Treatment failure in CR patients

Treatment method	external radiation	combined modalities	total
patterns of failure			
Primary site	—	1	1
Primary site + neck node	1	—	1
Primary site + distant metastasis	1	—	1
Neck node	2	—	2
Neck node + distant metastasis	1	—	1
Distant metastasis	1	2	3
Total	6(8)	3(14)	9(22)

() Number of patients with complete response

치료 후 1년 생존율은 방사선 단독 치료군이 63.6%, 병합 치료군이 65%, 전체 64.5%, 2년 생존율은 각각 54.5%, 25%, 및 35.4%, 3년 생존율은 각각 36.3%, 15%, 및 22.6%, 4년 생존율은 각각 27.2%, 15%, 및 19.4%, 5년 생존율은 각각 9%, 15% 및 12.4%이었다(표 6).

치료가 완료된 당시 완전 관해를 보인 22명의 환자에서 치료 실패는 방사선 단독 치료군에서는 8명중 6명에서 재발을 보였으며, 병합 치료군에서는 14명중 3명에서 재발을 보였다(표 7).

재발의 발현 시기는 방사선 단독 치료군에서는 7개월에서 4년 4개월사이에 재발을 보였으며, 원발 병소와 경부 임파선 재발이 3명 원격 전이를 동반한 국소 재발이 3명이었다. 병합치료군에서는 14명중 3명에서 6개월에서 4년 10개월사이에 재발을 보였으며, 경부 임파선 재발이 3명, 원격 전이가 2명이었다.

원격 전이가 일어난 부위는 방사선 단독 치료군에서 간 1명, 뇌 2명이었고, 병합치료군에서는 골 1명과 폐 1명이었다.

고 찰

비인강암은 서구에서는 드문 악성 종양이나 동남 아시아 지역에서는 비교적 빈도가 높은 악성 종양이다^{1,2)}. 해부학적으로 비인강은 수술이 불가능한 부위에 위치하기 때문에 방사선치료가 주된 치료법으로 전통적으로 알려져 있다^{3,5)}.

오랜 기간동안 주로 국소 재발의 방지에 대한 연구가 집중되었으나 5년 생존율은 30%에서 50%정도에 그치고 있다^{4,5)}.

대부분의 환자에서 진단 당시에 이미 국소적으로 진행된 경우나 임파선 전이를 동반하기

때문에 국소 재발의 감소와 경부 임파선병변의 근치에 많은 학자들의 관심이 집중되어 주위 정상 조직의 손상을 최소로 하면서 비인강의 원발 병소에 고선량을 조사할 수 있는 회전 조사나 근접치료가 통상적인 외부조사와 더불어 이용되었으며⁶⁻⁸⁾, 경부 임파선부위는 전자선치료를 이용하여 척수의 손상을 피하면서 고선량의 방사선조사가 가능하게 되었다.

그러나 생존율의 향상은 기대에 미치지 못하고 많은 환자들이 원발 병소나 경부 임파선 병변의 치료 실패 및 재발이나 원격 전이로 사망함에 따라 치료 실패의 원인규명에 관한 연구 보고가 많다^{9,10)}.

본 연구 대상환자의 임상적 특징은 Koh¹¹⁾ 등의 보고와 비슷하였으나, 병리 조직학적 분류에 따른 환자수는 미분화 세포암이 편평 세포암보다 1.5배 더 많아 상이한 양상을 보여 주었다.

항암제와의 병합치료는 편평 세포암보다 미분화 세포암에서 더 많이 시행되었는데 이는 진단 당시에 이미 국소적으로 진행되었거나 경부 임파선 전이를 동반하고 있었기 때문으로 생각되며, 미분화 세포암의 치료에서 항암제의 병합은 Rahima¹²⁾ 등의 주장과 일치되게 생존율의 향상을 보여 주었다.

치료에 대한 반응은 방사선 조사만 시행된 군의 미분화 세포암에서 5명 모두 완전관해를 보였으나 편평 세포암에서는 6명중 3명에서 완전관해를 보여 세포 종류에 따른 차이를 보여 주었으나, 병합 치료가 시행된 군에서는 세포 형태에 따른 차이가 없어서 Teo¹³⁾ 등과 Vokes¹⁴⁾ 등의 보고와 비슷하였다.

일반적으로 국소재발은 불충분한 조사 범위 및 부적절한 선량조사⁹⁾가 중요한 인자로 지적되고 있어서 조사 범위의 확대 및 조사 선량의 증가를 위한 강내조사^{6,8)} 등이 다양하게 시행되어 국소 재발은 줄어 들었으나 생존율의 향상은 큰 변화가 없었다¹¹⁾.

그 결과 원격 전이를 예방하기 위한 방법으로 항암제 투여의 필요성이 대두되었으며 방사선 치료와 병합 치료에 대한 여러가지 임상적 치료 결과가 보고되고 있다¹²⁻¹⁶⁾.

그러나 항암제와 방사선치료를 병행하는 경우에 치료의 우선순위 결정에는 보고자마다 서로 다른 주장이 있다.

즉 근치적인 방사선치료전에 유도 화학요법을 시행하는 경우에는 방사선 단독으로 치료를 시행한 경우보다 원격 전이가 조기에 발생할 수가 있고 경부 임파선의 관해정도 또한 병합한 경우보다 방사선 단독치료가 더 우수하였다고 Teo¹²⁾ 등은 보고하고 있으며, 경부 임파선이 치료에 반응하는 정도가 가장 중요한 예후 결정 인자가 되기 때문에 항암제 투여를 위하여 방사선치료를 연기하여서는 안된다고 지적하고 있다.

한편 Rahima¹²⁾ 등은 미분화 세포암인 경우 방사선 단독 치료보다는 항암제와 병합한 경우에 생존율과 무병 생존율이 통계학적으로 의의가 있을 만큼 향상됨을 보여주고 있어서 서로 상반된다고 생각되나 이는 환자 개개인에게 가장 적절한 치료법의 선택이 중요함을 시사하고 있다.

본 연구에서 방사선치료만 시행된 경우에 완전관해된 8명중 6명에서 치료 실패를 보였으며 그중 3명은 원격 전이를 동반하고 있었다. 반면에 항암제를 병합한 경우에는 완전관해된 14명중 3명에서 치료 실패를 보였으며 그중 2명이 원격 전이를 보여서 병합치료가 재발 방지 특히 원격 전이의 감소에 기여함을 보여주어 Carter 등¹⁴⁾의 주장과 일치함을 보여 주었다.

오늘날 대부분의 센터에서는 비록 생존율의 향상에는 비교적 제한된 향상을 가져 오지만 국소적으로 진행된 경우나 경부 임파선 전이를 동반한 경우에는 원격 전이를 방지하기 위하여 어떤 형태로든 방사선치료와 항암제를 병합 실시하고 있으며^{15,16)}, 저자들도 보다 광범한 임상적

시도를 통하여 더 효과적인 치료 schedule과 치료 조합의 정립을 위하여 노력할 것이며 멀리않은 장래에 국소 및 경부 임파선 재발의 감소와 생존율의 향상에 큰 발전이 있을 것을 확신한다.

요 약

1986년 4월부터 1992년 3월까지 6년간 영남대학교 의과대학 부속병원 치료방사선과에 내원하여 근치적인 방사선치료를 시행한 후 6개월 이상 추적조사가 가능하였던 31명의 치료성적은 다음과 같다.

대상환자 31명중 남자가 22명으로 여자보다 2.4배 많았으며 30세미만 3명을 제외하면 30대에서 60대까지 고른분포를 보였다.

병리조직학적 분류상 편평세포암이 13명, 미분화세포암이 18명이었다.

임상적병기는 I기 1명, II기 2명, III기 6명, IV기 22명이었다.

31명중 방사선치료만 시행된 경우가 11명, 항암제등과 병합치료를 시행한 경우가 20명이었다.

편평세포암 환자 11명중 6명에서 방사선치료만을 시행하였고 5명에서 병합치료를 시행하였으나, 미분화세포암에서는 18명중 5명은 방사선치료만을 시행하였고 13명은 병합치료를 실시하였다.

치료에 대한 반응은 치료방법에 따른 차이가 없었으나, 방사선치료만 시행한 경우에 편평세포암 6명중 3명이 완전관해를 보인 반면에, 미분화세포암 5명 모두 완전관해를 보여 큰 차이를 보였으나 병합치료에서는 세포형태에 따른 차이가 소실되었다.

치료 후 1년 생존율은 치료방법에 따른 차이가 없었다.

완전관해를 보인 환자 22명중에서 방사선치료만 시행한 8명중 6명에서 재발을 보였으며 그중 3명은 원격전이를 동반하였으나, 병합치료를 시행한 14명중에서 3명만이 재발을 보였으며 그중2명은 원격전이를 보였다.

이상의 결과에서 치료방법에 따른 관해율은 비슷하였으나 치료 후 추적과정에서 발생하는 재발은 방사선치료만 시행한 경우보다 병합치료를 실시한 경우에 현저히 줄어들음을 보여주어 비인강암에 대한 병합치료가 국소재발의 감소및 원격전이의 감소를 통하여 생존율의 향상에도 기여하리라 사료된다.

참 고 문 헌

1. Henderson BE : Nasopharyngeal carcinoma : present status of knowledge. Cancer res 34 : 1187-1188, 1974.
2. Ho JHC : An epidemiologic and clinical study of nasopharyngeal carcinoma. Int J Radiation Oncology Biol Phys 4 : 183-198, 1978.
3. Myers EM : Head and neck oncology, Little, Brown and company, Boston, 1991, p 166.
4. Hoppe RT, Goffinet DR, Bagshaw MA : Carcinoma of the nasopharynx : eighteen years' experience with megavoltage radiation therapy. Cancer 37 : 2605-2612, 1976.
5. Mesic JB, Fletchert GH, Goepfert H : Megavoltage irradiation of epithelial tumors of the nasopharynx. Int J Radiation Oncology Biol Phys 7(4) : 447-453, 1981.
6. Wang CC : Accelerated hyperfractionation radiation therapy for carcinoma of the nasopharynx : technique and results. Cancer 63 : 2461-2467, 1989.
7. 신세원, 강철훈, 김성규, 김명세 : 강내조

- 사를 이용한 비인강암 치험 2예. 영남의대
학술지 7(1) : 197-201, 1990.
8. 신세원, 김성규, 김명세 : 고선량을 강내
조사를 이용한 두경부암의 방사선 치료. 영
남의대학술지 7(2) : 109-114, 1990.
9. Bedwinek J, Perez C, Keys D : Analysis
of failures after definitive irradiation for epi-
dermoid carcinoma of the nasopharynx. Can-
cer 45 : 2725-2729, 1980.
10. Yamashita S, Kondo M, Inuyama Y, Hashi-
moto S : Improved survival of patients with
nasopharyngeal squamous cell carcinoma. Int
J Radiation Oncology Biol Phys 12 : 307-312,
1986.
11. Koh KH, Park WY, Cho CK, Yoo SY, Shim
YS, Oh KK : Radiation therapy of nasophar-
yngeal carcinoma KCCH experience(1964-19
84). J Korean Soc Ther Radiol 8(1) : 29-
34, 1990.
12. Rahima M, Rakowsky E, Barzillay J, Side J
: Carcinoma of the nasopharynx : an anal-
ysis of 91 cases and a comparison of differing
treatment approaches. Cancer 58 : 843-849,
1986.
13. Teo P, Ho JHC, Choi P, Tsui TH : Adjunc-
tive chemotherapy to radical radiation therapy
in the treatment of advanced nasopharyngeal
carcinoma. Int J Radiation Oncology Biol
Phys 13 : 679-685, 1987.
14. Vokes EE, Mick R, Lester EP, Panje WR,
Weichselbaum RR : Cisplatin and fluoroura-
cil chemotherapy does not yield long-term be-
nefit in locally advanced head and neck cancer
: results from a single institution. J Clin On-
col 9 : 1376-1384, 1991.
15. Carter SK : The chemotherapy of head and
neck cancer. Sem Onc 4 : 413-423,
1977.
16. Gregoire V, Beauduin M, Humblet Y, Ha-
moir M, Longueville J, Majois F, Remacle
M, Rousseau F, Salamon E, Wambersie A,
Sumann M : A phase I - II trial of induction
chemotherapy with carboplatin and fluoroura-
cil in locally advanced head and neck squa-
mous cell carcinoma : a report from the
UCL-oncology group. Belgium J Clin Oncol
9 : 1385-1392, 1991.

—Abstract—

Radiation Therapy of Nasopharyngeal Cancers

Sei One Shin, Sung Kyu Kim, Myung Se Kim

*Department of Therapeutic Radiology**College of Medicine, Yeungnam University**Taegu, Korea*

Radiotherapeutically, nasopharyngeal cancer is an important disease in Korea. Because of its blind anatomic location, early detection is relatively uncommon.

Clinically, most of cases are locally advanced and nodal involvement are common. Recently better understanding of nature of the disease and improvement of radiotherapy technique permit better treatment results, including locoregional control and survival rate, and minimal normal tissue damages comparing with previously published data.

We analyzed 31 patients of pathologically proven and previously untreated nasopharyngeal carcinoma with different treatment techniques, retrospectively.

Minimal and maximal follow up period of the survivor is 6 months and 68 months, respectively.

Thirteen patients with squamous cell carcinoma are included in this analysis. The median age is 49 years (range from 20 to 64 years). Twenty two patients are stage III. Eleven patients are treated with radiotherapy alone and 20 are treated with combined modalities treatment.

The degree of responses after radiotherapy are categorized by 3-classes, i.e. complete response, partial response. In spite of similarities of complete response rate and 1-year survival rate between two different treatment techniques, those patients with undifferentiated carcinoma appear to benefit from the adjuvant chemotherapy. In addition, systemic failure is more prominent in radiotherapy alone group than in combined modalities treatment group. These results suggest that adjuvant therapy in the radiotherapeutic management of nasopharyngeal cancers needs additional research according to histologic types and future extensive clinical trials.

Key Words : Radiotherapy, Nasopharyngeal carcinoma, Combined modality treatment,
Locoregional control, Survival rate